

Miejscowość, dnia.....

Imię i nazwisko Pacjenta

.....

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pesel

Waga.....

Prosimy o postawienie X w miejscu prawidłowej odpowiedzi	TAK	NIE
Czy były wykonywane badania z paramagnetycznym środkiem kontrastowym?		
Jeśli tak, to czy po podaniu środka kontrastowego wystąpiły jakieś reakcje alergiczne? Jakie:.....		
Czy jest Pan/Pani uczulona na leki ? Jeśli tak to na jakie.....		
Czy stwierdzono u Pana/Pani alergię? Jaką		
Czy cierpi Pan/Pani na jedną z wymienionych chorób: cukrzyce, astmę oskrzelową, padaczkę, nadciśnienie tętnicze, chorobę wieńcową, hemofilię, zaburzenia krzepności krwi? * * proszę podkreślić właściwe		
Czy cierpi Pan/Pani na niewydolność nerek?		
Proszę wypisać leki, jakie Pan/Pani przyjmuje na stałe:		

**Zgoda na badanie MR (Rezonans Magnetyczny)
Z podaniem środka kontrastowego**

Środki kontrastowe stosowane w rezonansie magnetycznym mogą powodować reakcję niepożądaną, które występują rzadko, są zwykle łagodne i krótkotrwałe (w niektórych przypadkach mogą wystąpić późne reakcje uczuleniowe). Należą do nich:

- Nudności, wymioty, zaburzenia smaku, uczucie zmęczenia, zwiększona potliwość
- Parastezje, reakcje skórne, pokrzywka, świąd, bladość skóry, egzema
- Ból i uczucie zimna lub gorąca w miejscu podania, bóle i skurcze mięśni
- Zaburzenia świadomości, padaczka, ból głowy i uczucie gorąca
- **Reakcje anafilaktyczne:** obrzęk naczyń, wstrząs, nagłe zatrzymanie krążenia, obniżenie ciśnienia krwi, obrzęk krtani, skurcz krtani, oskrzeli, stridor, obrzęk płuc, zaburzenia oddychania, kaszel, katar, kichanie, zapalenie spojówek, ból brzucha, ból w klatce piersiowej, wysypka
- Przerwanie ciągłości żyły, wynaczynienie kontrastu poza żyłę

O każdym przypadku wystąpienia objawów nietolerancji środka kontrastowego należy natychmiast poinformować personel medyczny pracowni.

Pacjencie!

Wywiad alergiczny, oraz wcześniejsze reakcje uboczne na jodowe środki cieniujące w TK i gadolinowe środki kontrastowe w MR zwiększają prawdopodobieństwo występowania działań niepożądanych. Należy zachować ostrożność przy podawaniu środków kontrastowych pacjentom ze schorzeniami nerek, w takich przypadkach przed badaniem MR z kontrastem, celem oceny wydolności nerek, zalecane jest wykonanie badania kreatyniny z surowicy.

U chorych z przewlekłą chorobą nerek gadolinowe środki kontrastowe stosowane w MR mogą rzadko powodować także schorzenie nerek o nazwie- Nerkowe włóknienie układowe (ang. NSF- Nephrogenic Systemic Fibrosis), charakteryzujące się postępującym włóknieniem skóry i narządów wewnętrznych: wątroby, serca, płuc, przepony, mięśni.

Środki kontrastowe do badań MR nie wchodzą w interakcje z innymi lekami i w większości przypadków są szybko wydalane przez nerki w postaci niezmienionej. Wyrażam / nie wyrażam świadomą zgodę na badanie MR z dożylnym podaniem gadolinowego środka kontrastowego. Zostałem pouczony o możliwych wystąpienia powikłaniach jak również o ograniczonej wartości diagnostycznej badania MR w razie nie wyrażenia zgody na badanie z podaniem środka cieniującego. Mogłem/am wyjaśnić swoje wątpliwości, pouczenie personelu medycznego zrozumiałem/am, nie mam uwag.**

.....
Data i podpis pacjenta

W przypadku pacjenta niepełnoletniego między 16-18 r.ż. Zgoda równoległa opiekuna prawnego

.....
Data i czytelny podpis opiekuna prawnego

** niepotrzebne skreślić

Zlecenie dożylnie podane ml środka kontrastowego
Poziom kreatyniny
..... Data, pieczętka i podpis lekarza

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., 101, poz. 926, ze zm.) informujemy że Administratorem Danych Osobowych jest Centrum Medyczne Iwona Zys Sp.k z siedzibą w Rakoniewicach, ul. Ogrodowa 11a. Państwo dane osobowe przetwarzane są w zakresie określonym przepisami prawa w celu realizacji usług medycznych. Mają Państwo prawo do wglądu, aktualizowania i poprawiania swoich danych osobowych.